


Total number of printed pages-15



1 (Sem-3/FYUGP) MAT41 MJ

2025

MATHEMATICS

(Major)

Paper : MAT4300104MJ

(Ordinary Differential Equations)

Full Marks : 60

Time : 2½ hours

**The figures in the margin indicate
full marks for the questions.**

Answer **either** in English **or** in Assamese.

1. Answer the following questions : $1 \times 8 = 8$

তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰা :

(a) How many independent variables are involved in an ordinary differential equation ?

এটা সাধাৰণ অৱকল সমীকৰণত কিমানটা স্বতন্ত্ৰ চলক যুক্ত হৈ থাকে ?

(b) Consider the equation (তলৰ সমীকৰণটো)
 $(x+2y+3)dx + (2x+4y-1)dy = 0$.
 Can this equation be reduced to a
 homogeneous equation?

এই সমীকৰণটো এটা সমাধানিক সমীকৰণলৈ হ্ৰাস কৰিব
 পাৰি নে?

(c) Find the integrating factor of the linear
 differential equation $x^4 \frac{dy}{dx} + 2x^3y = 1$ ৰ
 বৈশিষ্ট্যকৰণ আৱকল সমীকৰণ $x^4 \frac{dy}{dx} + 2x^3y = 1$ ৰ
 আৱকল গুণক উলিওৱা।

(d) Define Wronskian of the real functions
 $f_1, f_2, \dots, f_n$ in $a \leq x \leq b$.
 $a \leq x \leq b$ অন্তৰ্ভুক্ত বাস্তৱ ফলন
 $f_1, f_2, \dots, f_n$ ৰ Wronskian ৰ সংজ্ঞা দিয়া।

(e) Find the general solution of $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$ ৰ
 সাধাৰণ সমাধান উলিওৱা।

(f) State one difference between
 complementary function and particular
 integral related to solutions of
 differential equations.

অৱকল সমীকৰণৰ সমাধানৰ লগত যুক্ত পৰ্বক ফলন
 আৰু বিশেষ অৱকলৰ মাজৰ এটা পাৰ্থক্য দিয়া।

(g) Can method of undetermined co-
 efficients be applied to find particular
 integral of $\frac{d^2y}{dx^2} + y = \cot ax$? Give
 reasons.

$\frac{d^2y}{dx^2} + y = \cot ax$ ৰ বিশেষ অৱকল নিৰ্ণয় কৰিবলৈ

অনিৰ্ণেয় সত্তা পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি নে? যদি
 দিয়া।

(h) Examine whether the functions x^2
 and $\frac{1}{x}$ are linearly independent or not.

x^2 আৰু $\frac{1}{x}$ ফলন দুটা বৈশিষ্ট্যকৰণ কৰা
 পৰীক্ষা কৰা।

2. Answer **any six** of the following questions :
2×6=12

তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ যিকোনো ছয়টাৰ উত্তৰ কৰা :

- (a) What is meant by implicit and explicit solution of a differential equation ?

এটা অৱকল সমীকৰণৰ অস্পষ্ট বা পৰোক্ষ আৰু স্পষ্ট বা প্ৰত্যক্ষ সমাধান মানে কি বুজায় ?

- (b) Find the most general function $N(x, y)$ such that the differential equation $(x^3 + xy^2)dx + N(x, y)dy = 0$ is exact.

এটা অতি সাধাৰণ ফলন $N(x, y)$ উলিওৱা যাতে

$(x^3 + xy^2)dx + N(x, y)dy = 0$ অৱকল সমীকৰণটো যথার্থ হয়।

- (c) Find the integrating factor of

অনুকলন গুণক উলিওৱা

$$(2x^2 + y)dx + (x^2y - x)dy = 0.$$

- (d) Write the general form of an n^{th} order Cauchy-Euler equation.

What transformation reduces it to a linear differential equation with constant co-efficients.

এটা n তম ঘাতৰ কচি-ইউলাৰ সমীকৰণৰ সাধাৰণ ৰূপটো লিখা।

কি ৰূপান্তৰে ইয়াক এটা ধ্ৰুৱক সহগ বিশিষ্ট বৈখিক সমীকৰণলৈ হ্ৰাস কৰে ?

- (e) Show that $\sin 3x$ and $\cos 3x$ are linearly independent solutions of the differential equation $\frac{d^2y}{dx^2} + 9y = 0$.

দেখুওৱা যে $\frac{d^2y}{dx^2} + 9y = 0$ অৱকল সমীকৰণটোৰ

$\sin 3x$ আৰু $\cos 3x$ দুটা বৈখিক ভাৱে স্বতন্ত্ৰ সমাধান হয়।

- (f) Explain briefly how a Bernoulli equation can be transformed to a linear equation.

এটা বাৰ্ণলী সমীকৰণ কেনেকৈ এটা বৈখিক সমীকৰণলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰি চমুকৈ ব্যাখ্যা কৰা।

- (g) The general solution of a second order homogeneous linear differential equation with constant co-efficients is $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$. Construct the equation.

এটা দ্বিঘাতৰ ধ্ৰুবক সহগ যুক্ত সমমাত্ৰিক বৈখিক অৱকল সমীকৰণৰ সাধাৰণ সমাধান হ'ল $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$ সমীকৰণটো গঠন কৰা।

- (h) Find the general solution :

সাধাৰণ সমাধান উলিওৱা :

$$\frac{d^3 y}{dx^3} + y = 0$$

- (i) Find the particular integral of :

বিশেষ অনুকল উলিওৱা :

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - 2 \frac{dy}{dx} + y = e^{2x} + 2$$

- (j) Define total differential of a function $F(x, y)$. 1+1=2

Find total differential of

$$F(x, y) = xy^2 + 2x^3 y.$$

$F(x, y)$ ফলনটোৰ পূৰ্ণ অৱকলৰ সংজ্ঞা দিয়া।

$F(x, y) = xy^2 + 2x^3 y$ ফলনটোৰ পূৰ্ণ অৱকল উলিওৱা।

Answer **any four** of the following questions : 5×4=20

তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ যিকোনো চাৰিটাৰ উত্তৰ কৰা :

- (a) Show that $x^3 + 3xy^2 = 1$ is an implicit solution of the differential equation

$$2xy \frac{dy}{dx} + x^2 + y^2 = 0 \text{ on the interval}$$

$$0 < x < 1.$$

দেখুওৱা যে $0 < x < 1$ অন্তৰালত

$$2xy \frac{dy}{dx} + x^2 + y^2 = 0 \text{ অৱকল সমীকৰণটোৰ}$$

$x^3 + 3xy^2 = 1$ এটা অন্তৰ্নিহিত সমাধান হয়।

(b) Solve the initial value problem

প্রাৰম্ভিক মানযুক্ত সমস্যাটো সমাধান কৰা

$$(y+2)dx + y(x+4y)dy = 0, \quad y(-3) = -1$$

(c) Solve by reducing to homogeneous equation.

সমমাত্রিক সমীকৰণলৈ হ্রাস কৰি সমাধান কৰা

$$(5x+2y+1)dx + (2x+y+1)dy = 0.$$

(d) Solve the Bernoulli equation

বাৰ্ণলী সমীকৰণটো সমাধান কৰা

$$\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x}y = x^2 y^3.$$

(e) Given $y = x+1$ is a solution of the differential equation :

$$(x+1)^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 3(x+1) \frac{dy}{dx} + 3y = 0$$

Find a linearly independent solution by reducing the order.

$$(x+1)^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 3(x+1) \frac{dy}{dx} + 3y = 0$$

অৱকল সমীকৰণটোৰ $y = x+1$ এটা সমাধান হয়।
সমীকৰণটোৰ মাত্ৰা হ্রাস কৰি আনটো বৈখিক ভাৱে স্বতন্ত্ৰ
সমাধান উলিওৱা।

(f) Solve (সমাধান কৰা) :

$$\frac{dy}{dx} + y = f(x) \quad \text{where (য'ত)}$$

$$f(x) = \begin{cases} 2, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x \geq 1 \end{cases}, \quad y(0) = 0.$$

(g) Solve the initial value problem :

প্রাৰম্ভিক মানযুক্ত সমস্যাটো সমাধান কৰা :

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - y = 4xe^x, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 2.$$

(h) Solve the Cauchy-Euler equation :

কচ্চি - ইউলাৰ সমীকৰণটো সমাধান কৰা :

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} - 4y = 0$$

4. Answer **any two** of the following questions :
10×2=20

তলত দিয়া প্রশ্নবোৰৰ যিকোনো দুটাৰ উত্তৰ কৰা :

- (a) Consider the differential equation

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

Where M and N have continuous first partial derivatives at all points (x, y) in its domain D .

Prove that the equation is exact in D if

and only if $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, for all $(x, y) \in D$

এটা অৱকল সমীকৰণ লোৱা হ'ল

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

য'ত M আৰু N দুয়োটা ফলনৰে আদিক্ষেত্ৰ D ৰ প্ৰতিটো বিন্দু (x, y) ত অৱিচ্ছিন্ন আংশিক অৱকল থাকে।

প্ৰমাণ কৰা যে, সমীকৰণটো যথার্থ হ'ব যদি আৰু যদিহে

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \quad \forall (x, y) \in D \text{ হয়।}$$

- (b) (i) Prove that if f and g are two different solutions of

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

then $f - g$ is a solution of the equation

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$$

দেখুওৱা যে $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ অৱকল সমীকৰণটোৰ যদিহে f আৰু g দুটা সমাধান হয়

তেন্তে $\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$ সমীকৰণটোৰ $f - g$

এটা সমাধান হ'ব।

- (ii) Consider the differential equation

$$(4x + 3y^2)dx + 2xy dy = 0$$

- (I) Show that the equation is not exact.

- (II) Find an integrating factor of the form x^n , where n is a positive integer.
- (III) Multiply the given equation by the integrating factor found in (II) and solve the resulting exact equation.

$$1+2+4=7$$

তলৰ অৱকল সমীকৰণটো লোৱা।

$$(4x + 3y^2)dx + 2xydy = 0$$

- (I) দেখুওৱা যে সমীকৰণটো যথার্থ ন হয়।
- (II) এটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা n ৰ বাবে সমীকৰণটোৰ x^n আৰ্হিৰ অনুকলন গুণকটো উলিওৱা।
- (III) (II) ত প্ৰাপ্ত অনুকলন গুণকেৰে সমীকৰণটো পূৰণ কৰি লব্ধ যথার্থ সমীকৰণটো সমাধান কৰা।



- (c) Solve by method of variation of parameters

প্ৰাচলৰ তাৰতম্য পদ্ধতিৰে সমাধান কৰা

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 6\frac{dy}{dx} + 9y = \frac{e^{-3x}}{x^3}.$$

- (d) Find the general solution

সাধাৰণ সমাধান উলিওৱা

$$\frac{d^4y}{dx^4} - 3\frac{d^3y}{dx^3} + 2\frac{d^2y}{dx^2} = 4\sin 2x + e^x.$$

- (e) (i) Can the method of undetermined co-efficients be applied to find particular integral of all types of linear non-homogeneous differential equations with constant co-efficients? Explain. 2

অনিৰ্ণেয় সহগ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি সকলোধৰণৰ ধ্ৰুবক সহগ বিশিষ্ট বিসমমাত্ৰিক বৈখিক অৱকল সমীকৰণৰ বিশেষ অনুকল উলিওৱা সম্ভৱ নে? ব্যাখ্যা কৰা।

- (ii) The particular integral assumed by the method of undetermined coefficients for the differential

$$\text{equation } \frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} - 3y = 2e^{4x}$$

$$\text{is } y_p = Ae^{4x}$$

where as by the same method the particular integral assumed for the

$$\text{equation } \frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} - 3y = 2e^{3x}$$

$$\text{is } y_p = Axe^{3x}.$$

Explain the validity of the assumptions. 8

অনির্ণেয় সহগ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} - 3y = 2e^{4x}$$

অৱকল সমীকৰণৰ বাবে ধৰি লোৱা বিশেষ অনুকল

$$\text{হৈছে } y_p = Ae^{4x}$$

আনহাতে একেই পদ্ধতিৰে

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} - 3y = 2e^{3x}$$

সমীকৰণৰ বাবে ধৰি লোৱা বিশেষ অনুকল হৈছে

$$y_p = Axe^{3x}$$

দুইটা ধাৰণাৰে বৈধতা ব্যাখ্যা কৰা।

